

Gospodarstwo Ogrodnicze Tadeusz Kusibab ul. Zbyszka z Bogdańca 16; 31-979 Kraków; tel.: +48 (12) 643 15 20 w. 10

Sorte	Zeitpunkt des Fruchtreagens	Merkmale der Früchte	Beerenmasse	Geschmack	Anwendung	Strauchgröße	Merkmale des Strauches	Fruchtbildung	Widerstandsfähigkeit gegen Kälte und Pathogene	Rechtsschutz
<b>Bristol (schwarz)</b>	Ende VI - Anfang VII	Früchte brüchig, knackig, groß, kugelförmig von guter Qualität, Farbe nah schwarz mit einem grauen Bezug, flaumig, sind leicht zu pflücken und 'bluten' nicht	-	süß, aromatisch und saftig	Sorte gut geeignet für Einmachen, Gelees, Konfitüre, Säfte, zum Gefrieren, frisch zum Essen, zur Dekoration von Kuchen.	2-4 m	Aufrechter und kompakter Strauch, einige bis über zehn starke, verzweigte blau graue Triebe mit Dornen. Bildet unzählige Wurzelsprosse. Am besten wachsen mit Stützen.	auf zweijährigen Trieben	widerstandsfähig gegen Kälte, Schädlinge und die Mehrheit der Krankheiten (empfindlich gegen Virus- und Pilzkrankheiten)	nein
<b>Erika</b>	Anfang VIII	Früchte hellrot, leicht orange, werden nicht dunkler nach der Ernte, knackig, leicht zu pflücken	5,4 g	frisch i fruchtig	Dessert-Sorte	bis 3 m	-	auf einjährigen Trieben (kann Fruchtbildung wiederholen)	winterhart	ja
<b>Laszka</b>	Anfang VI	kegelförmig, länglich, Frucht leicht flaumig, lebendig rot, hell, kompakt, knackig	12 g (4 cm Länge)	-	Dessert- und Verarbeitungssorte, zum Gefrieren und für Einmachen. Geeignet für eine maschinelle Ernte. Früchte vertragen Transport gut und können lange gelagert werden.	1,8 m	Sorte mit starker Wuchsstärke, Triebe steif, bogenförmig am Gipfel. Zahlreiche kleine Dornen.	auf zweijährigen Trieben (Ernte bis 20 t/ha)	Neuaustrieb erfriert kaum, manchmal können Knospen während harten Wintern geschädigt werden, geringe Anfälligkeit für Scleroderis und Fruchtfäule	ja
<b>Polana</b>	Mitte VIII	Früchte groß, kegelförmig, lebendig rot und glänzend, Fruchtfleisch kompakt und knackig	-	süß und saftig	Eignen sich für sofortigen Konsum und für die Verarbeitung (hauptsächlich für Marmeladen, Brei, Desserts, Obstwasser, Säfte, Dörrobst zum Gefrieren).	1,5 m	Pflanze bildet sehr viele steife Triebe, wenig gebuegt, müssen nicht unterstützt werden). Triebe mit verkümmerten Dornen.	auf einjährigen Trieben (kann Fruchtbildung wiederholen)	winterhart, Sorte mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen Schädlinge und Krankheiten	ja
<b>Polka</b>	Anfang VIII	Früchte ziemlich groß, schmackhaft, kegelförmig, rot, glänzend, Fruchtfleisch kompakt und knackig	-	sehr süß und saftig	Dessert-Früchte, für sofortigen Konsum, zum Gefrieren und Verarbeitung (Marmeladen, Säfte, Desserts, Brei, Kompott). Geeignet für eine maschinelle Ernte und Transport. Früchte bleiben nach der Ernte lange frisch.	1,8 m	Strauch von mittlerer Wuchsstärke. Triebe haben recht große Dornen. Anbau im Tunnel vorteilhaft	auf einjährigen Trieben (kann Fruchtbildung wiederholen)	winterhart, widerständig gegen Schädlinge und Krankheiten	ja
<b>Poranna Rosa (gelb)</b>	Anfang IX	Farbe warm von gelb bis orange, leicht glänzend, leicht flaumig, groß, fast rund, stark mit dem Blütenbecher zusammengewachsen, Fruchtfleisch kompakt, knackig, geringe Anfälligkeit Fruchtfäule	-	süß und saftig	Desser-Früchte, gut für Transport (verfaulen nicht und werden nicht beschädigt)	1,5 m	Strauch von mittlerer Wuchsstärke, Triebe stark, steif, stark stachelig, mit einem schwachen Wachsüberzug. Kann ohne Stützen wachsen.	auf einjährigen Trieben (kann Fruchtbildung wiederholen)	Pflanze winterhart, aber Triebe und Knospen können während harten Wintern geschädigt werden, widerständig gegen die Mehrheit der Schädlinge und Krankheiten (empfindlich gegen Pilzkrankheiten der Triebe und Mehltau)	ja
<b>Radziejowa</b>	2 Hälfte VI	Früchte groß, kegelförmig, rot mit nicht großem Glanz, attraktiv knackig, wenig anfällig für mechanische Beschädigungen während Ernte und Transport und wenig anfällig für Faulung.	-	-	Desser-Früchte, empfohlen für Verarbeitung. Wenig anfällig für mechanische Beschädigungen während Ernte und Transport, stabil im Warenhandel.	-	Strauch von mittlerer Wuchsstärke. Erzeugt mittelgroße Anzahl von einjährigen Trieben und Wurzelsprossen. Triebe mittelmäßig dick, steif. Junge Triebe hellgrün mit Anthozyan Verfärbung, ältere Purpur braun. Dornen klein, kurz, selten verteilt.	auf zweijährigen Trieben	Pflanze winterhart, aber Knospen können während harten Wintern geschädigt werden, widerständig gegen die Mehrheit der Schädlinge und Krankheiten (empfindlich gegen Krakenheiten der Triebe)	ja
<b>Sokolica</b>	Ende VI	Früchte sind groß, attraktiv, schmackhaft, kegelförmig mit einer stumpfen Spitze, hellrot mit nicht großem Glanz, knackig, wenig anfällig für mechanische Beschädigungen während Ernte und Transport und wenig anfällig für Faulung, werden nicht glanzlos	-	-	Desser-Früchte und für frischen Markt, i na frisch rynek, wenig anfällig für mechanische Beschädigungen während Ernte und Transport und widerständig gegen Faulung	-	Starker Wachstum, kompakte Pflanzengestalt, mittelgroße Anzahl von einjährigen Trieben und Wurzelsprossen. Triebe mittelmäßig dick, steif, am Gipfel bogenartig überhängend.	auf zweijährigen Trieben	Pflanze winterhart, aber Knospen können während harten Wintern geschädigt werden,	ja
<b>Tadmor</b>	spät reifend	Früchte kegelförmig, glänzend, attraktiv hellrot, Fruchtfleisch knackig, reifen gleichmäßig, haltbar und abgeglichen wenn es um Form und Farbe geht	ungefähr 5 g (max. 7 g)	süß-sauer mit deutlichem Geschmack und Duft	Desser-Früchte und für frischen Markt	2-2,5 m	Schnell wachsende Sorte. Triebe brauchen Stützen. Empfohlen für Gehäuse.	auf zweijährigen Trieben	winterhart	ja

Wir stimmen der Nutzung der Daten zu sofern die folgende Information beinhaltet wird:

Quelle: Gartenbaubetrieb Tadeusz Kusibab [www.in-vitro.pl](http://www.in-vitro.pl)